

Albendazol

FELTRES[®]

Suspensión antihelmíntico

COMPOSICIÓN:

Cada 10 mL contiene:

Albendazol.....400 mg

Excipientes c.b.p.....10 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Como antiparasitario, el Albendazol FELTRES[®] causa alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del intestino de vermes al unirse a un sitio de unión específico de la tubulina, inhibiendo así la polimerización y ensamblaje de los microtúbulos.

INDICACIONES:

En el tratamiento de la parasitosis intestinal única o múltiple. Albendazol[®] Feltrex (Albendazol) es efectivo en el tratamiento de:

1-Ascaris lumbricoides (ascariasis)

2-Trichuris trichiura (tricocefalosis)

3-Enterobius vermicularis (enterobiasis)

4-Ancylostoma duodenales y necator americanus (uncinariasis)

5-Taenia sp (teniasis).

6-Strongyloides stercoralis (strongiloidiasis).

7-Albendazol FELTRES[®] está indicado en el tratamiento de giardiasis intestinal.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo sospecha del mismo, lactancia y en aquellos pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Reacciones adversas: En algunos casos pueden presentarse molestias gastrointestinales y cefalalgias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No debe administrarse durante los tres primeros meses de embarazo ya que se ha comprobado que el Albendazol es teratogénico en animales. Este medicamento debe ser usado por prescripción médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Suspensión:

Niños de 1 año: 200 mg equivalente a 5 mL en una sola toma.

Niños mayores de 12 años y adultos: 10 mL (400 mg) de suspensión como dosis única.

En giardiasis: 10 mL por día durante 5 días consecutivos.

Es recomendable repetir el tratamiento de Albendazol FELTRES[®] cada 4 a 6 meses a fin de romper el ciclo biológico del parásito y la reinfestación familiar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

Aun con dosis altas no se han observado efectos colaterales diferentes a los descritos.

En caso de sobredosis se deberán adoptar medidas sintomáticas (lavado gástrico) y tratamiento general de apoyo.

REACCIONES ADVERSAS:

Elevación leve a moderada de enzimas hepáticas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, vértigo, cefalea, alopecia reversible, fiebre.

INTERACCIONES:

Se ha reportado que praziquantel incrementa los niveles plasmáticos del metabolito activo del albendazol.

PRESENTACIÓN:

Albendazol FELTRES[®]: Caja con 14 frascos x 10 mL

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-201-40-02



FELTRES

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001