

Ambroxol

FELTREX®

Mucolítico, Expectorante,

Jarabe

COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL contiene:

Ambroxol HCL.....15 mg
Excipiente c.b.p.....5 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa sobre los neumocitos tipo II, estimulando la producción de surfactante, con esto se disminuye la viscosidad y adhesividad del moco; disuelve el tapón formado y facilita la movilización de la secreción fluidifica.

CONTRAINDICACIONES:

Ambroxol FELTREX® está contraindicado en los pacientes con alergias o hipersensibilidad al Ambroxol.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En pacientes asmáticos, con insuficiencia respiratoria grave o en aquellos con enfermedades que cursen con espasmo bronquial, un incremento de la fluidez de las secreciones puede dar lugar a una obstrucción de las vías respiratoria si la expectoración no es adecuada. Además, en caso de administración por inhalación, puede producirse broncoconstricción. Se recomienda por lo tanto extremar las precauciones en estos pacientes. En caso de administrarse mediante inhalación, se recomienda administrar previamente un broncodilatador.

Úlcera péptica: Ambroxol FELTREX® puede dar lugar a vómitos a la vez que podría reducir la fluidez del moco gástrico y su efecto protector. Existe mayor riesgo de empeoramiento de la úlcera y hemorragia gástrica, por lo que se recomienda extremar las precauciones en estos pacientes.

Insuficiencia renal grave: En estos pacientes se puede producir una disminución del aclaramiento del Ambroxol FELTREX® y de sus metabolitos, con mayor riesgo de reacciones adversas.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL 3 veces al día durante los 2 primeros días. Después 5 mL 3 veces al día. En niños de 5 a 11 años 5 mL 2 o 3 veces al día.

En niños de 2 a 5 años: 2.5 mL cada 8 horas 3 veces al día.

En niños menores de 2 años: 2.5 mL cada 12 horas 2 veces al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

Síntomas: No se han producido hasta la fecha reacciones de sobredosis.

Tratamiento: Se recurrirá a las medidas habituales de eliminación del tratamiento sintomático. Se mantendrán las vías respiratorias libres de secreciones, recostando al paciente y practicando una respiración bronquial.

REACCIONES ADVERSAS:

Gastrointestinal: Diarrea, náuseas, vómitos y cefalea.

INTERACCIONES:

Antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxiciclina). La administración de antibióticos y ambroxol produce una elevación de los niveles pulmonares del Ambroxol FELTREX®.

Antitusivos. El Ambroxol FELTREX® aumenta la fluidez de las secreciones bronquiales por lo que no se aconseja administrarlo junto con antitusivos, que podrían inhibir el reflejo de la tos y dar lugar a una obstrucción pulmonar. Fármacos inhibidores de la secreción bronquial (anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos H1, antiparkinsonianos, IMAO, neurolépticos). Pueden antagonizar los efectos del Ambroxol.

PRESENTACIÓN:

Ambroxol FELTREX®: 15 mg/5 mL frasco con 120 mL

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-014-40-06



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001