

Ampicilina

FELTREX®

Antibiótico penicilínico semisintético,

Antibiótico de Amplio Espectro,

Capletas

COMPOSICIÓN:

Cada Capleta contiene:

Ampicilina Trihidratada.....	1.154 g
Equivalente a Ampicilina Base.....	1.000 g
Excipientes c.b.p.....	1 Capleta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Los antibióticos betalactámicos como la Ampicilina FELTREX® actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs (Penicillin-Binding Proteins) localizadas en la pared celular. Al impedir que la pared celular se construya correctamente, la ampicilina ocasiona, en último término, la lisis de la bacteria y su muerte

INDICACIONES:

Ampicilina FELTREX® es un antibiótico de amplio espectro, que actúa sobre gérmenes grampositivos y gramnegativos, razón por la cual Ampicilina FELTREX® es la elección para infecciones como:

Infecciones de las vías respiratorias: Bronquitis aguda y crónica, bronconeumonía, neumonía.

Infecciones otorinolaringológicas: Amigdalitis, faringitis, sinusitis, mastoiditis y otitis.

Infecciones genitourinarias: Pielitis, pielonefritis aguda y crónica, cistitis.

En el hombre: Epididimitis, uretritis, gonorrea.

En la mujer: Aborto séptico, anexitis, fiebre puerperal, endometritis, pielonefritis gravídica, mastitis.

Otras indicaciones: Infecciones del tracto intestinal, infecciones de las vías biliares, dermatológicas, meningitis, endocarditis y septicemia.

CONTRAINDICACIONES:

Personas hipersensibles a las Ampicilinas deben abstenerse al uso de Ampicilina FELTREX®.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Si sus síntomas no mejoran en unos días, o si empeoran, consulte a su médico. Este medicamento puede causar diarrea en algunos pacientes. La diarrea muy fuerte puede ser una señal de un efecto secundario serio. No tome ningún medicamento para la diarrea sin consultar primero con su médico.

Puede que los anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas) que contienen estrógeno no funcionen correctamente mientras está tomando este medicamento. Pueden ocurrir embarazos no planeados. Use un anticonceptivo diferente o adicional mientras esté usando este medicamento.

Diabéticos:

Este medicamento puede causar resultados falsos con algunos análisis de azúcar en la orina.

Consulte a su médico antes de cambiar su dieta o la dosificación de su medicamento para la diabetes. Este medicamento no debe ser dado a otras personas ni usado para otras infecciones a menos que su médico le haya indicado lo contrario.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Capletas 1g:

1 capleta cada 8 horas o según criterio médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

SOBREDOSIS:

Igual que las sobredosis de penicilinas; hipersensibilidad neuromuscular (agitación, confusión, convulsiones, encefalopatía). Desbalance electrolítico (con sales de sodio como potasio, especialmente en falla renal). En caso de sobredosis inducir de inmediato al vómito y acudir a un centro de salud.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden ocurrir, de preferencia, en individuos en los que previamente se ha demostrado hipersensibilidad a las penicilinas, y en aquellos con antecedentes de alergia, asma, fiebre del heno o urticaria. Se han reportado las siguientes reacciones secundarias como asociadas al uso de Ampicilina FELTREX®.

Gastrointestinales: Glositis, estomatitis, náusea, vómito, enterocolitis, colitis pseudomembranosa y diarrea. Estas reacciones habitualmente se asocian con las dosis orales del medicamento.

Reacciones de hipersensibilidad: Con mucha frecuencia se ha reportado erupción cutánea eritematosa, medianamente prurítica y maculopapular. La erupción que, por lo general, no se desarrolla dentro de la primera semana de terapia, puede llegar a cubrir el cuerpo entero, plantas de los pies, palmas de las manos y la mucosa bucal. Habitualmente, la erupción desaparece en un periodo de 3 a 7 días.

Otras reacciones de hipersensibilidad reportadas son: Erupción cutánea, prurito, urticaria, eritema multiforme, y casos ocasionales de dermatitis exfoliativa. La anafilaxia es la reacción más grave que se puede experimentar, y se le ha asociado con la dosis por vía parenteral del medicamento.

INTERACCIONES:

Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, pueden interactuar con Ampicilina FELTREX®:

Alopurinol: Puede ocurrir una mayor posibilidad de erupción cutánea, en particular en pacientes hiperuricémicos.

Antibióticos bacteriostáticos: Cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas o las tetraciclinas pueden interferir con el efecto bactericida de las penicilinas. Esto se ha demostrado in vitro; sin embargo, no se ha documentado el significado clínico de esta interacción.

Anticonceptivos orales: Pueden ser menos efectivos y presentar sangrado intermedio. Probenecid: Puede reducir la secreción tubular renal de Ampicilina FELTREX®, lo que resulta en mayor nivel sanguíneo y/o toxicidad por Ampicilina FELTREX®.

PRESENTACIÓN:

Ampicilina FELTREX®: Caja de 1.0 g. con 100 capletas.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-005-40-03



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001