

Diclofenac

FELTREX®

Antiinflamatorio, Analgésico, Antirreumático

Tabletas.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Diclofenac Sódico..... 50 mg
Excipientes c. b.p..... 1 tableta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Diclofenac FELTREX® es un derivado del ácido fenilacético.

Diclofenac FELTREX® ejerce su acción al bloquear la ciclooxigenasa 1 y 2 (COX1 y COX2), por ende interfiriendo en la producción de prostaglandinas. Disminuye las concentraciones del ácido araquidónico y los leucocitos.

INDICACIONES:

Artritis, reumatoidea, espondilitis anquilosante, artrosis, espondiloartrosis, gota. Estados dolorosos inflamatorios de origen no reumático, inflamación dolorosa postraumática y postoperatoria, dismenorrea, anexitis.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, periodo de lactancia, en niños menores de 6 años. También en casos de úlcera gástricas, duodenales, trastornos de la función hepática y hematopoyéticos. Debe tenerse especial cuidado en pacientes hipersensibles a los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente en pacientes que sufren de asma, fiebre del heno, pólipos nasales e infecciones de las vías respiratorias, urticaria o rinitis aguda por ácido acetilsalicílico u otros inhibidores de la prostaglandina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Medicamento de uso delicado, manténgase fuera del alcance de los niños. Debe administrarse con precaución en pacientes con úlceras pépticas, colitis ulcerativas. Ingiera el medicamento junto a las comidas.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Niños: Mayores de 6 años según prescripción médica.

Adultos: Iniciar con 1 tableta 3 veces al día y luego reducir a una tableta al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

Los casos de sobredosis con Diclofenac FELTREX® se presentan en forma aislada. Los síntomas son: vértigo, cefalea, hiperventilación, disturbio de la conciencia. Trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal y sangrado), como también alteraciones hepática y renal. No existe antídoto específico. Las medidas terapéuticas en el caso de sobredosis son las siguientes: Lavado gástrico y tratamiento con carbón activado, lo más rápido posible para evitar la absorción. El tratamiento sintomático y de soporte se administrará en caso de complicaciones como hipotonía, insuficiencia renal y depresión respiratoria.

REACCIONES ADVERSAS:

Al inicio del tratamiento pueden presentarse disturbios gastrointestinales, raras veces alergias, erupciones y reacciones anafilácticas. Espóricamente trastornos del SNC, raras veces edemas y trastornos hematopoyéticos en tratamientos largos.

INTERACCIONES:

Administrado en forma simultánea con preparados de Litio o Digoxina, puede elevar el nivel plasmático de éstos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. Se ha descrito que el peligro de hemorragias aumenta durante el empleo combinado de Diclofenac y

anticoagulantes. Puede aumentar la concentración sanguínea del Metotrexato y elevar su toxicidad. La nefrotoxicidad de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroideos del Diclofenac sobre las prostaglandinas renales.

PRESENTACIÓN:

Diclofenac FELTREX®: Caja con 100 tabletas.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-044-40-01



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001