

DOLO Ultrafén FORTE®

Acetaminofén, Vit B1, B6, B12, Clorvezanona
Analgésico, Vitaminas Neurotropas, Relajante Muscular
Capletas.

COMPOSICIÓN:

Cada capleta contiene:

Acetaminofén.....	325 mg
Clorvezanona.....	100 mg
Tiamina Mononitrato (Vit. B1).....	50 mg
Piridoxina hcl (Vit. B6).....	100 mg
Cianocobalamina (Vit. B12).....	0,1 mg
Excipientes c, b, p.....	1 capleta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Dolo Ultrafén Forte® combina equilibradamente las vitaminas antineuríticas del complejo B, el poder analgésico del acetaminofén y la clorvezanona.

Esta acción múltiple es altamente efectiva en todo tipo de dolores agudos o crónicos y como relajante muscular. La forma funcionalmente activa de la tiamina es el pirofosfato de tiamina, que interviene en el metabolismo de los carbohidratos como cofactor de las deshidrogenasas y transcetolasas. El fosfato de piridoxal actúa como coenzima en varias transformaciones metabólicas de los aminoácidos. La vitamina B6 interviene en la síntesis de los siguientes neurotransmisores, ácido gamma-aminobutírico, dopamina, serotonina, así como en la síntesis de los esfingolípidos que constituyen la vaina de mielina. La vitamina B12 participa en la síntesis de ácidos nucleicos, en la síntesis de la vaina de mielina de las fibras nerviosas y en el proceso de maduración de los eritrocitos.

Clorvezanona: Disminuye el tono de la musculatura estriada. Se utiliza para relajar el sistema músculo esquelético y reducir el dolor debido a esguinces, contracturas, espasmos o lesiones. Se considera que tiene un mecanismo no determinado.

INDICACIONES:

Dolo Ultrafén Forte® está indicado en estados agudos y dolorosos, neuralgias, y neuritis, síndrome lumbar, cervical, humero braquial; neuralgia de trigémino, ciática, herpes zoster, esguinces musculares y tendinosos, contusiones.

Procesos inflamatorios y degenerativos: osteoartritis, bursitis, fibrositis, tortícolis, miositis, dolores neurales, cefalalgia.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en personas sensible a sus ingredientes, y en estado de hipoxia-origen pulmonar cardíaco.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Este medicamento no debe mezclarse con aspirina u otros analgésicos. Si se presenta somnolencia deberá reducirse la dosis. Al igual que otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, los pacientes que reciben clorvezanona no deben tener en cuenta los efectos aditivos que se producen al ingerir alcohol u otros agentes con acción en el sistema nervioso central.

Deben consultarse al médico si usa por más de 10 días y si se usa concomitantemente con otros medicamentos.

Debido a la ausencia de estudios de reproducción en animales, el uso de este medicamento en el embarazo, lactancia o en mujeres con probabilidad de embarazo, dependerá de que los beneficios esperados por el medicamento justifiquen el posible riesgo para la madre y el feto.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO:

1-2 capletas 3 veces al día, continuando el tratamiento 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

No se ha descrito casos de sobredosificación por tiamina o por vitamina B12. La neuropatía sensorial y los otros síndromes neuropáticos sensoriales producidos por la administración de megadosis de piridoxina mejoran paulatinamente al discontinuar la vitamina y al cabo de un tiempo se obtiene la recuperación completa.

Acetaminofén: La necrosis hepática potencialmente fatal es el efecto adverso más severo de la sobredosis por paracetamol (acetaminofén). Además, se puede presentar necrosis renal tubular aguda, hipoglucemia y trombocitopenia. Los signos tempranos de hepatotoxicidad incluyen náuseas, vómito, diarrea, diaforesis y malestar general.

La evidencia clínica y de laboratorio de sobredosis puede aparecer hasta 48 a 72 horas post-ingesta del medicamento.

En adultos, rara vez se presentan casos de hepatotoxicidad con dosis menores a los 10 g y casos fatales con menos de 15 g.

Clorvezanona: debilidad muscular severa, depresión respiratoria (respiración rápida e irregular)

El manejo inmediato debe encaminarse al soporte de la función cardiorrespiratoria y a medidas para reducir la absorción del medicamento. Si el paciente se encuentra alerta y consciente está indicado el vaciamiento gástrico por inducción del vómito mecánicamente o utilizando jarabe de ipecacuana a dosis de 5 a 10 ml en niños y 15 ml en adultos. Se puede repetir la dosis 20 a 30 minutos después si no se ha producido el vómito, posteriormente se administrará carbón activado 1 mg/kg, acompañado de un catártico.

REACCIONES ADVERSAS:

En casos aislados ligera somnolencia, mareos, obnubilación.

INTERACCIONES:

Debe evitarse el uso concomitante como: digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetilsalicílico y L-dopa.

PRESENTACIÓN:

Dolo-Ultrafén Forte®: Caja con 50 sobres con 2 capletas.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese este medicamento en un lugar fresco, seco, y fuera del alcance de los niños.

EMP-050-40-03



FELTRES

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001