

Famotidina

FELTREX®

Antiulceroso, Antagonista de los receptores H₂,
Tabletas.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Famotidina..... 40 mg
Excipientes c,b,p..... 1 tableta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Famotidina FELTREX® antagonista de los receptores H₂ de la histamina disminuyendo la secreción gástrica. Inhibe la secreción de ácido gástrico por el bloqueo competitivo de la histamina en el receptor H₂, además de inhibir la secreción de ácido estimulada por la gastrina y en menor grado por los agonistas muscarínicos. Los antagonistas H₂ reducen tanto el volumen de jugos gástricos como la concentración de H⁺. También disminuye la secreción de factor intrínseco, pero como en condiciones normales este se produce en exceso, es suficiente para la absorción de vitamina B₁₂, por ende no se produce deficiencia de esta vitamina aún en tratamiento prolongado.

INDICACIONES:

Famotidina FELTREX® está indicada en úlcera duodenal, úlcera gástrica, estados de hipersecreción gástrica (Zollinger-Ellison), Reflujo gastroesofágico y prevención gástrica de recidivas de úlcera duodenal.

CONTRAINDICACIONES:

Famotidina FELTREX® está contraindicada en pacientes hipersensibles a los antagonistas de los receptores H₂.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Famotidina FELTREX® no debe utilizarse en período de embarazo y lactancia. Antes de iniciar el tratamiento debe descartarse la presencia de neoplasia gástrica, en caso de insuficiencia renal debe ajustarse la dosis de Famotidina.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

En úlceras gástricas y duodenales 1 tableta de 40mg por las noches durante 4 a 8 semanas.

En síndrome de Zollinger-Ellison, tomar 20 mg cada 6 horas, hasta ajustar la dosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

SOBREDOSIS:

Hasta la fecha no hay datos disponibles acerca de sobredosificación deliberada. Se han administrado dosis de hasta 640 mg/día a pacientes con estados hipersecretorios y no se han presentado efectos secundarios de importancia. Si esto llegara a suceder, se recomienda dar tratamiento sintomático y de soporte, incluyendo lavado gástrico y la administración.

REACCIONES ADVERSAS:

Se han reportado algunos casos de cefaleas, mareos, diarrea, artralgia, pancitopenia, trombocitopenia.

INTERACCIONES:

Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad oral de Famotidina por lo que ambas administraciones se espaciarán 1 hora. Famotidina puede reducir la absorción oral de ketoconazol, por lo que se espaciarán 2 horas ambas administraciones. Estudios realizados con Famotidina no han mostrado aumento de los niveles hemáticos de alcohol tras la ingestión del mismo.

PRESENTACIÓN:

Famotidina FELTREX® 40 mg: Caja con 100 tabletas.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-052-40-03



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001