

# Furatrex-mt®

Antidiarreico, Antiséptico Intestinal,  
Suspensión.

## COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL contiene:  
Furazolidona.....25 mg  
Excipientes c.b.p..... 5mL

## MECANISMO DE ACCIÓN:

Microbicida, interfiriendo con algunos sistemas enzimáticos bacterianos, principalmente a nivel del ciclo de Krebs. No altera la flora intestinal normal ni produce sobrecrecimiento fungal.

## INDICACIONES:

Furatrex-mt® está indicado en diarreas de cualquier etiología, colitis, enterocolitis.

**Advertencia:** Durante la administración de Furatrex-mt®, la orina puede presentarse excesivamente amarilla, lo cual es un efecto normal del medicamento dada su eliminación por vías urinarias.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al medicamento. Mujeres con embarazo a término o en casos de infarto reciente. En deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa por el riesgo de que desencadene anemia hemolítica. Contraindicado en pacientes sometidos a tratamiento a base de la monoaminooxidasa.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Durante el tratamiento no deberán ingerirse bebidas alcohólicas. La administración de furazolidona puede tornar el color de la orina a anaranjado o rojizo oscuro.

### Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:

No se administre durante el primer trimestre del embarazo al término del mismo ni durante la lactancia.

## POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

**Niños:** 5mL 3-4 veces al día.

**Adultos:** 10 mL 3-4 veces al día.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

## SOBREDOSIS:

No se han reportado casos de sobredosificación o ingesta accidental con Furatrex-mt®. En caso de que esto ocurriera se recomienda vaciamiento y/o lavado gástrico lo antes posible tras la ingestión del medicamento.

## REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente náuseas vómito erupción cutánea (urticaria) cefalea. Estas molestias desaparecen al suspender el tratamiento.

## INTERACCIONES:

Furatrex-mt® puede potenciar el efecto de los inhibidores de la MAO de los antidepresivos tricíclicos antihistamínicos sedantes y simpaticomiméticos. Puede dar lugar a una reacción tipo disulfiram cuando se administra conjuntamente con bebidas alcohólicas.

## PRESENTACIÓN:

Furatrex-mt®: Caja con frasco con 60 mL.

## CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Emp-061-40-04



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001