

Meda®

MEJOR ESTIMULANTE DEL APETITO

COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL contiene:

L Carnitina.....	150 mg
Lisina HCL	150 mg
Tiamina HCL	0.60 mg
Riboflavina 5 Fosfato (Vit B2).....	0.95 mg
Piridoxina HCL (Vit B6).....	0.60 mg
Cianocobalamina(Vit B12).....	0.10 mg
Nicotinamida.....	5 mg
Excipientes c.b.p.....	5 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Carnitina: Es un nutriente enzimático que genera energía y da fuerza a los músculos, además aumenta el apetito al estimular las secreciones digestivas.

La Lisina: Es de gran importancia durante la etapa del crecimiento.

Las vitaminas del complejo B: Actúan como coenzimas en el metabolismo de proteínas y carbohidratos evitando que puedan producirse alteraciones bioquímicas y patológicas de importancia cuando existe carencia de estas. Las vitaminas del complejo B tienen conocida propiedades tónicas y energizantes.

Nicotinamida: También denominado ácido nicotínico o niacina, endógenamente se obtiene de la transformación del triptófano consumido. Es componente de dos coenzimas presentes en todas las células, que participan en múltiples procesos metabólicos incluyendo glicólisis, metabolismo de ácidos grasos y respiración tisular.

INDICACIONES:

Meda® jarabe está indicado en los pacientes que presentan disminución del peso corporal durante el crecimiento, en convalecencia por intervenciones quirúrgicas, en astenia geriátrica.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Embarazo y lactancia: Se encuentra contraindicado durante la gestación y la lactancia. No debe ser usado en recién nacido, ni en lactantes prematuros. Tampoco debe ser usado en lactantes menores que presenten alteraciones metabólicas de importancia.

Con la calidad FELTREX es mejor

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Niños de 1 a 2 años: 5 mL al día o según criterio del médico.

Niños de 3 a 5 años: 5 mL o 10 mL al día

Niños mayores de 5 años: 10 mL al día

Adultos: 15 mL al día.

Administrar una hora antes de las comidas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

En casos de sobredosis accidental, se deben aplicar las medidas de soporte médico que correspondan.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede presentar somnolencia y raramente náuseas y sequedad bucal. Los pacientes pueden presentar en casos de sobredosis (fundamentalmente en niños) síntomas de tipo antihistamínico.

INTERACCIÓN:

Puede administrarse con cualquier otra medicación.

PRESENTACIÓN:

Meda® Jarabe: Caja con frasco de 120 mL

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-065-40-03



FELTREX

Pioneros de la Calidad
en República Dominicana

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001