

Piroxicam FELTREX®

Analgésico, Antiinflamatorio no Esteroide, Tabletas.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Piroxicam.....20 mg
Excipientes c.b.p.....1 tableta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas secundaria a la inhibición de la ciclooxigenasa. Piroxicam FELTREX® también inhibe la activación de los neutrófilos que también contribuyen a los efectos inflamatorios.

INDICACIONES:

Piroxicam FELTREX® está indicado en los procesos donde se requiere una efectiva, segura y rápida acción antiinflamatoria y/o analgésica tales como enfermedades reumáticas con localización articular, artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, tumefacciones posttraumáticas, contusiones, torceduras, fracturas, procesos dolorosos de origen no traumáticos, bursitis, lumbalgias, torticolis, estados postoperatorios.

CONTRAINDICACIONES:

Piroxicam FELTREX® está contraindicado en hipersensibilidad a este fármaco, embarazo, lactancia, en úlceras gastroduodenal y en pacientes en los cuales el ácido acetilsalicílico y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos les han inducido síntomas asmáticos, rinitis y urticaria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Medicamento de uso delicado. Úsese exclusivamente por prescripción y vigilancia médica.

POSOLÓGIA Y MODO DE USO:

Se recomienda 20 a 40 mg de Piroxicam FELTREX® cada 24 horas. Se recomienda además, ingerir las tabletas de Piroxicam FELTREX® en el desayuno o con una comida principal con el fin de disminuir el riesgo de los efectos indeseables o de tipo gastrointestinales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis con Piroxicam FELTREX®, está indicada una terapia sintomática y de soporte. Los estudios indican que la administración de carbón activado puede reducir la absorción y reabsorción de Piroxicam FELTREX®, así como de la cantidad total de la droga activa disponible.

Sin embargo, en vista de que la droga se liga altamente a proteínas, no existen estudios a la fecha, que indiquen que la hemodiálisis probablemente no es de utilidad en el aumento de la eliminación de Piroxicam FELTREX®.

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden presentarse trastornos gastrointestinales; efectos sobre SNC, tales como insomnio, somnolencia, cefalea, depresión, confusión mental. También puede aparecer visión borrosa, hipersensibilidad dérmica, leucopenia, eosinofilia.

INTERACCIONES:

Se ha reportado que los antiinflamatorios no esteroideos pueden incrementar los niveles de litio en el plasma. La administración concomitante de Piroxicam FELTREX® y aspirina resulta en una reducción de los niveles plasmáticos de Piroxicam FELTREX® en 80%.

PRESENTACIÓN:

Piroxicam FELTREX® 20 mg: Caja con 50 tabletas

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-078-40-04



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

