

Secnidazol

FELTREX®

Amebicida, Giardicida, Tricomonicida,
Capletas.

COMPOSICIÓN:

Cada capleta contiene:

Secnidazol.....500 mg
Excipientes c.b.p.....1 capleta

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un 5-nitroimidazol que ejerce su acción antiparasitaria penetrando por difusión pasiva en la membrana y actuando directamente sobre el ADN del parásito mediante la reducción del grupo 5-nitro y la posterior activación de la enzima piruvato-ferredoxina oxidorreductasa (POR) que forma un radical anión, con la consiguiente interrupción del flujo normal de electrones, provocando así la pérdida de la estructura helicoidal normal impidiendo el copiado del ADN. Este mecanismo de acción citotóxica es particularmente activo en contra de aquellos microorganismos cuyo ADN contienen una gran cantidad o porcentaje de adenina y timina, como es el caso de la Trichomonas vaginalis y la Entamoeba histolytica

INDICACIONES:

Uretritis y vaginitis causadas por tricomonas vaginalis, amebiasis intestinal, amebiasis hepática y Giardiasis.

CONTRAINDICACIONES:

Al igual que otros derivados imidazólicos está contraindicado en discrasias sanguíneas. Hipersensibilidad a los derivados imidazólicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Realizar la determinación del tiempo de protrombina y el monitoreo de la INR (International Normalized Ratio) con más frecuencia. La ingestión de bebidas alcohólicas, debe evitarse ya que ocasiona intolerancia, semejante a la producida por el disulfiram, inclusive medicamentos que contengan alcohol

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Amebiasis y Giardiasis:

Adultos: Un solo tratamiento de 2 capletas por la mañana, 2 capletas por la noche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

SOBREDOSIS:

A dosis terapéuticas el secnidazol es bien tolerado, sin embargo cuando hay una ingesta de sobredosis deberá mantenerse en vigilancia al paciente y de presentar náusea, vómito o ataxia que son datos de intoxicación, se recomienda traslado al hospital y medidas generales de sostén.

En caso de dosis masiva accidental o intencional tratar de extraer el fármaco mediante vómito o lavado gástrico.

Uteritis y Vaginitis causadas por tricomonas vaginales:

Adultos: 2 g en una dosis antes de los alimentos.

Amebiasis intestinal Aguda: Amebiasis sintomática (forma histolytica).

Adulto: 2 g (dos capletas en la mañana y dos capletas en la noche).

Amebiasis hepática:

Adulto: 1,5 g por día una o más dosis por 5 días.

REACCIONES ADVERSAS:

El Secnidazol FELTREX® es bien tolerado, pero puede producir náusea, vómito, ardor epigástrico y mal sabor de boca.

INTERACCIONES:

Potencializa los efectos de los anticoagulantes orales (warfarina): anticoagulantes orales e incrementa el riesgo de hemorragia por disminución del catabolismo hepático. **Se debe ajustar la dosis de anticoagulantes orales como:** warfarina, acenocumarina, decumarol, anisodina, durante el tratamiento con Secnidazol FELTREX® y 8 días después de su suspensión; no debe administrarse concomitantemente con Disulfiram (medicamento que se utiliza para la cura de abstinencia alcohólica); cuando se administra Fenobarbital y Secnidazol FELTREX® aparentemente disminuye la vida media sérica del Secnidazol FELTREX®; en asociación con litio puede ocasionar toxicidad.

La ingestión de bebidas alcohólicas, debe evitarse, ya que ocasiona intolerancia, semejante a la producida por el Disulfiram, inclusive medicamentos que contengan alcohol.

PRESENTACIÓN:

Secnidazol FELTREX® 500mg: Caja con 8 capletas.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-085-40-02



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001