

Tussibron® TOS

SIN AZÚCAR

Oxolamina Citrato, Antitusivo, Antiinflamatorio
Jarabe

COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL contiene:
Oxolamina Citrato.....50 mg
Excipientes c.b.p.....5 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Tussibron® TOS Sin Azúcar actúa a nivel de la mucosa respiratoria inflamada, reduciendo los fenómenos exudativos y la irritación de las terminaciones sensitivas tusígenas. Mejora la capacidad de defensa de las vías respiratorias altas.

INDICACIONES:

Tussibron® TOS Sin Azúcar está indicado principalmente en pacientes diabéticos para las siguientes afecciones: Tos aguda y crónica de cualquier naturaleza, tos por sarampión, tos ferina, asma bronquial, tos de los fumadores.

Afecciones catarrales agudas y crónicas del árbol respiratorio: Bronquitis, Laringotraqueitis, enfermedades por resfriamiento, etc.

Geriatrica: Broncopatía crónica senil, desarrollando actividad bronquiolítica. Puede utilizarse durante el embarazo.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al fármaco. No administrar a niños menores de 3 meses.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Usese con precaución en pacientes que usan anticoagulantes orales, en los cuales debe controlarse el tiempo protrombina. Embarazo y lactancia: no se han realizado estudios controlados en embarazadas. Su administración durante el embarazo y la lactancia debe valorar las ventajas contra el posible riesgo para el feto o el lactante

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Niños: mayores de 2 años: 5 mL cada 4 horas.
Adultos: 10 mL a 15 mL cada 4 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

SOBREDOSIS:

Los efectos de sobredosis con el citrato de oxolamina pueden ser: vómito, vértigo y agitación motora.

Estos deben ser contrarrestados por medidas generales y específicas, se tiene que inducir el vómito o efectuar lavado gástrico y vigilar al paciente.
Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas más frecuentes en personas sensibles pueden ser náuseas, vómitos, rash cutáneo, trastornos gastrointestinales y somnolencia. En raras ocasiones se puede presentar alucinaciones en niños.

INTERACCIONES:

No debe administrarse en forma concomitante con anticoagulantes, ya que se puede prolongar el tiempo de protrombina.

PRESENTACIÓN:

Tussibron® TOS Sin Azúcar Caja con Frasco con 120 mL

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-089-40-06



FELTRES

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001