

# Tussibron® TOS

Oxolamina Citrato, Antitusivo, Antiinflamatorio  
Jarabe

#### COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL contiene:  
Oxolamina Citrato.....50 mg  
Excipientes c.b.p.....5 mL

#### MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa a nivel de la mucosa respiratoria inflamada, reduciendo los fenómenos exudativos y la irritación de las terminaciones sensitivas tusígenas. Mejora la capacidad de defensa de las vías respiratorias altas.

#### INDICACIONES:

Tussibron® TOS está indicado en tos aguda y crónica de cualquier naturaleza, tos por sarampión, tosferina, asma bronquial, tos de los fumadores, afecciones catarrales agudas y crónicas de árbol

Respiratorio (bronquitis, laringotraqueitis, enfermedades por resfriamiento etc.  
**Geriatría:** Broncopatía crónica senil, desarrollando actividad bronquiolítica.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al fármaco. No administrar a niños menores de 3 meses.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Úsese con precaución en pacientes que usan anticoagulantes orales, en los cuales debe controlarse el tiempo protrombina.

**Embarazo y lactancia:** no se han realizado estudios controlados en embarazadas. Su administración durante el embarazo y la lactancia debe valorar las ventajas contra el posible riesgo para el feto o el lactante

#### POSOLOGIA Y MODO DE USO:

**Niños:** Mayores de 2 años: 5 mL cada 4 horas.

**Adultos:** 10 mL a 15 mL cada 4 horas.

#### SOBREDOSIS:

**Los efectos de sobredosis con el citrato de oxolamina pueden ser:** vómito, vértigo y agitación motora.

Estos deben ser contrarrestados por medidas generales y específicas, se tiene que inducir el vómito o efectuar lavado gástrico y vigilar al paciente.

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas más frecuentes en personas sensibles pueden ser náuseas, vómitos, rash cutáneo, trastornos gastrointestinales y somnolencia. En raras ocasiones se puede presentar alucinaciones en niños.

#### INTERACCIONES:

No debe administrarse en forma concomitante con anticoagulantes, ya que se puede prolongar el tiempo de protrombina.

Vía de Administración: Oral

#### PRESENTACIÓN:

Tussibron® TOS 50mg/5mL: Caja con Frasco de 120 mL

#### CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-088-40-05



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

