

# Ultrafén®

ULTRA

Acetaminofén, Cafeína, Antimigrañoso

Capleta.

#### COMPOSICIÓN:

Cada capleta contiene:

Acetaminofén.....	500 mg
Cafeína.....	65 mg
Excipiente c.b.p.....	1 capleta

#### MECANISMO DE ACCIÓN:

##### Acetaminofén:

Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

##### Cafeína:

La cafeína es un estimulante directo y moderado del sistema nervioso central y también estimula el corazón y el sistema cardiovascular. La cafeína también estimula el centro respiratorio medular y relaja el músculo bronquial liso. También estimula el músculo voluntario y la secreción gástrica de ácido, aumenta el flujo sanguíneo renal y tiene propiedades diuréticas moderadas.

#### INDICACIONES:

Ultrafén® Ultra está indicado en crisis aguda de migraña y otras cefaleas vasculares, Dolor premenstrual, dolor muscular.

#### CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, lactancia, pacientes con enfermedad vascular periférica, cardiopatía coronaria, hipertensión, sepsis y trastornos de la función hepática o renal. Es debido al efecto vasoconstrictor arteriolar de la cafeína.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Debe disminuirse la ingesta de cafeína a través de alimentos y bebidas ricas de la misma, ya que Ultrafén® Ultra contiene cafeína y el uso en exceso de esta sustancia puede producir inquietud, irritabilidad, insomnio y taquicardia.

No debe utilizarse en los niños menores de 12 años a menos que su médico lo autorice. No exceder 8 capletas en 24 horas.

#### POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

**Adultos:** 2 capletas cada 6 horas durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si es necesario administrar 1 capleta luego de media hora si los síntomas persisten.

**Adolescentes:** 1 capleta cada 6 horas durante el aura o el inicio de la jaqueca. Si es necesario administrar 1 capleta luego de media hora si los síntomas persisten.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

#### SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis masiva los datos clínicos son: náusea, vómito, diaforesis, malestar general; se debe provocar el vómito mediante la toma de jarabe de ipecacuana ya que dentro de las primeras 24 a 72 horas no existe evidencia de daño hepático. La acetilcisteína es el antídoto universal para la sobredosificación de paracetamol y es más efectiva si se administra dentro de las 10 a 12 horas después de la ingesta de la sobredosis, además de las medidas de soporte necesarias.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Es raro que ocurran reacciones de sensibilización a las dosis recomendadas. Se presentan en raras ocasiones cualesquiera de los siguientes efectos adversos tales

como: rash cutáneo, agranulocitosis, anemia, etc. A dosis elevadas provoca daño hepático; estimulación del SNC; ansiedad, irritabilidad, insomnio o nerviosismo, taquicardia, náusea, vómito y diarrea.

#### INTERACCIONES:

Presenta interacción medicamentosa con barbitúricos que inhiben el metabolismo de la cafeína como norfloxacina y ciprofloxacina. El paracetamol y la cafeína no deben suministrarse asociados a la ingesta crónica del alcohol y sustancias potencialmente hepatotóxicas.

#### PRESENTACIONES:

Ultrafén® Ultra: Caja con 6 sobres con 2 capletas.

Ultrafén® Ultra: Caja con 25 sobres con 2 capletas.

Ultrafén® Ultra: Caja con 50 sobres con 2 capletas.

#### CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños

EMP-179-40-04



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

