

15.5 cm

Diodina®

Diosmina+Hesperidina
 Capleta recubierta
 Flebotónico, vasculoprotector y antihemorroidal

COMPOSICIÓN:

Cada capleta recubierta contiene:
 Fracción flavonoica purificada y micronizada.....500 mg
 (Equivalente a 450 mg de Diosmina+50 mg Hesperidina)
 Excipientes c.b.p.....1 Capleta recubierta

Grupo farmacoterapéutico: Vasoprotectores/Estabilizadores de capilares/Bioflavonoides
 (C05CA53: Sistema cardiovascular).

MECANISMO DE ACCIÓN: Disminuye el problema de la insuficiencia venosa crónica al prolongar la actividad de la noradrenalina sobre la tónica muscular venosa, logrando acortar el tiempo de vaciado, disminuir la distensibilidad y capacidad venosa. La acción sobre la microcirculación mejora la perfusión tisular inhibiendo la síntesis de los radicales libres y protegiendo al tejido en contra de sus efectos.

Ejerce un efecto inhibitor sobre la síntesis de las prostaglandinas PGE2, PGF2a y tromboxano, así como también inhibe la reacción de degradación del AMP cíclico por la fosfodiesterasa y actúa sobre las formas reactivas del oxígeno producidas por los polimorfonucleares.

INDICACIONES:

Diodina® está indicado en Insuficiencia venosa: Pacientes con várices, Síndrome varicoso e insuficiencia venosa, flebalgias, piernas pesadas, edemas estáticos de piernas, secuelas postflebiticas, estados pre ulcerosos, hemorroides, y hemorragias por fragilidad capilar.

CONTRAINDICACIONES: Por estudios realizados y por el buen coeficiente de seguridad, Diodina® puede utilizarse para tratar la insuficiencia venosa del embarazo, sin riesgo para la paciente y/o el producto.

Embarazo: No se ha observado ningún efecto teratogéno en los diversos estudios ni se ha descrito ningún efecto adverso en seres humanos.

Lactancia: Al no disponer de datos sobre la excreción en la leche materna, se deberá evitar el tratamiento durante la lactancia.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: El uso durante el embarazo, está indicado ya que los estudios realizados dan un buen coeficiente de seguridad en esta población, por lo que puede utilizarse sin riesgo para la paciente o su producto.

REACCIONES ADVERSAS: Aun cuando la tolerabilidad es buena, ocasionalmente se han reportado molestias gastrointestinales leves (menos del 2%) en personas sensibles: náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia. Se han señalado algunos casos de trastornos neurovegetativos dolor de cabeza, malestar, vértigo, y trastornos cutáneos: erupción, prurito, urticaria. Estos desórdenes no han obligado a suspender el tratamiento.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha encontrado acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto, mediano y largo plazo. Los estudios han demostrado una buena tolerabilidad en ratas, ya que no se produjeron anomalías histológicas o anatómicas, habiéndoles administrado dosis de hasta 180 veces la de un humano, en el caso de los primates se administró dosis 35 veces superiores a las del humano durante 26 semanas, sin encontrar evidencia importante.

INTERACCIONES: En caso de medicamentos antiácidos o alimentos con una alta alcalinidad, puede disminuir su absorción por lo que no debe de administrarse simultáneamente.

PRECAUCIONES: No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. Embarazo, lactancia y fertilidad. Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene la intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.



No se tiene constancia de ningún efecto nocivo en la especie humana. Se debe extremar la precaución en el uso de diosmina durante el embarazo, valorando adecuadamente el posible beneficio de este medicamento durante el mismo. No se tiene constancia si el medicamento pasa a leche materna, por lo que se desaconseja su uso durante la lactancia.
Crisis hemorroidal: Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es indispensable consultar a su médico. La administración de este producto no excluye el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado.

Trastornos de la circulación venosa: Este medicamento demuestra toda su eficacia cuando va acompañado por una buena higiene. Evitar la exposición al sol, el calor, la posición de pie prolongada y el exceso de peso. La marcha y eventualmente el uso de medias adaptadas favorecen la circulación sanguínea.

Embarazo: No se han demostrado en estudios en animales efectos teratogénicos. En humanos no se ha demostrado ningún efecto nocivo hasta el momento. Se debe extremar la precaución en la prescripción a mujeres embarazadas.

LACTANCIA: Si bien no hay datos actuales no debe administrarse el medicamento durante la lactancia.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

Posología y modo de uso:
 Adultos: La dosis recomendada en adultos es de 2 capletas recubiertas al día, repartidos en dos tomas, una capleta al medio día, y otro por la noche, con las comidas.

El alivio de los síntomas se produce, habitualmente, en las primeras 2 semanas de tratamiento. Si no siente alivio a las 2 semanas o los síntomas empeoran, debe consultar al médico. Por indicación del médico se puede continuar el tratamiento con la misma dosis diaria (2 capletas diarias) hasta 2 a 3 meses.

Uso en niños y adolescentes: No se ha establecido la seguridad y eficacia de diosmina en niños y adolescentes

SOBREDOSIS: No se han presentado a la fecha reportes de sobredosis, en caso de que ocurra es necesario que se dé tratamiento sintomático específico y vigilar los signos vitales.

PRESENTACION: Caja de 30 capletas Recubiertas
ALMACENAMIENTO: Consérvese en lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

EMP-295-40-00



Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

8.0 cm

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DIODINA PROSPECTO

DIMENSIONES:

Ancho: 8.0 cm
 Altura: 15.5 cm

Full Color Tiro Retiro

CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO



Diseñado por: Hansel Mauriz
Ultima Corrección: 26.07.2024
Corrección #

APROBACION DE ARTE

Area de Mercadeo

Area de Calidad

Area de Productos Nuevos

Asesor Médico

NOTAS